

飼料用米 知事特認品種「月の光」栽培ごよみ(稚苗移植)

茨城県農業再生協議会
令和6年1月作成
(監修) 茨城県農業総合センター

時 期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月						
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
作 業 (5月下旬移植)	耕起			播種準備			催芽 施肥・代かき 播種 移植			除草剤 散布			穂肥			病虫害防除			収穫			乾燥 調製			土づくり			
生育ステージ (5月下旬移植 ①) (5月上旬移植 ②)	例 ①			● 出芽			○ 2.2~2.5 葉期			▲ 活着期			△ 分げつ期			△ 幼穂 形成期			◎ 出穂期			(登熟期)			● 成熟期			<ul style="list-style-type: none"> ・堆肥の施用 ・稲わらのすき込み ・耕深15cm以上の確保
水 管 理	(5月下旬移植)			入水			浅水(活着・分げつ促)			中干し			間断かんがい			落水			落水									

収量・品質目標

粗玄米収量 680kg/10a

玄米水分 15.0%以下

品種特性

品種名	早晚性	草型	移植期 (月日)	出穂期 (月日)	成熟期 (月日)	稈長 (cm)	収量 (kg/10a)	千粒重 (g)	耐倒 伏性	耐病性		脱粒性	穂発 芽性
										縞葉 枯病	葉い もち		
月の光	晩生	穂重	5.22	8.16	10.03	87	646	22.6	強	抵抗性	強	難	やや 難
コシヒカリ	中生	中間	5.07	7.25	9.03	95	583	21.8	弱	罹病性	弱	難	難

試験データ: 茨城県農業総合センター農業研究所水田利用研究室(龍ヶ崎市大徳町)平成28年および29年成績による。

「月の光」は多肥栽培・遅植え、「コシヒカリ」は一般栽培・適期植えの結果。

収量確保のポイント

1. 穂数を確保しにくいので、地力の低い圃場は避け、多肥栽培とする。また、生育後半の栄養状態に注意し、追肥を行う。
2. 極端な疎植栽培は避ける。
3. 熟期が遅いので、成熟期間が確保できるよう作期に注意する。
4. 適切な病虫害の防除に努める。
(ヒメトビウンカ、斑点米カメムシ類、いもち病、稲こうじ病)

●種子の準備 (種子量: 10a当たり3kg)

- ・種子消毒の有無を確認し、必要に応じて薬剤や温湯消毒(60℃・10分)により種子伝染性病害の防除を行う。

●育 苗

- ・5月上旬移植までは20~24日間、5月中旬以降の移植では15~18日間を基準に播種を行う。目標とする葉齢は2.2~2.5葉。
- ①浸種・催芽
 - ・浸種水温10~15℃。
 - ・積算温度100℃。
 - ・催芽は28~30℃でハトムネ状態にする。
- ②播種
 - ・一箱当たりの播種量は乾籾で160g程度とする。
 - ・10a当たりの移植に必要な苗箱数は15~18箱。
- ③播種後の管理
 - ・温度、かん水は主食用品種に準じる。

●収穫適期

- ・収穫適期は、穂首近くに緑色を残した籾が穂全体の10%程度になった頃以降。
- ・立毛乾燥を行い、主食用米との作業調整と乾燥コストの削減を図る。
(倒伏、穂発芽、鳥害等に注意する)
- ・採種時は、籾水分25%以下、回転数を15%程度落として収穫する。

●乾燥・調製

- ・品質を考慮しないため、温度設定をやや高めにして乾燥効率を上げることも可能。
(契約先の品質規格に注意)
- ・保存性を高めるため、仕上げの玄米水分は15.0%以下。
- ・種子は専用モードで乾燥し、籾水分14.5%以下にする。

●出穂後の農薬使用に対する注意点

- ・出穂以降(圃場において出穂した個体が始めて確認される時点以降)に農薬を使用する際は、籾摺りをして玄米で給餌する。ただし、この措置を要しない農薬を用いた場合には、籾米もしくは籾殻を含めた家畜への給餌が可能である。

●施 肥

- ・総窒素量(基肥分+穂肥分)は「コシヒカリ」栽培のプラス5~6kg程度、穂肥重点の施肥体系とする。
- ・穂肥は倒伏防止のため、出穂前20日頃(幼穂長3~5mm)に施用する。
【例】窒素施肥量10kgの場合: 基肥7kg+穂肥3kg、堆肥を利用する際には、その分基肥を削減する。
- ・リン酸およびカリ含量が十分な圃場では、基肥に低PK肥料、穂肥に硫安等を利用してコスト削減を図る。
(ただし、連年栽培による地力の低下に十分注意する)
- ・全量基肥肥料は晩生用を使用し、分施肥体系の総窒素量から10%程度減肥する(側条施肥では20%減肥)。

●田植え

- ・5月中の移植が望ましい。それ以降になると収量が低下し、倒伏しやすくなる。
- ・株間は18~22cm、株当たり4~5本植え、植付け深度は2~3cm。

●水管理

- ・2~3cmの浅水で活着・分げつを促す。
- ・有効茎を確保したら中干しを行い、その後は間断かんがいとする。
- ・落水は出穂期後30日以降、用水が早期に止まる場合には直前に溜めておく。